

**KDL**КЛИНИКО-  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
ЛАБОРАТОРИИ

129281, Россия, г. Москва, ул. Енисейская д. 37 стр. 1

e-mail: info@moscow.kdl-test.ru сайт: www.kdllab.ru

тел/факс: +7-800-700-60-40

Качество клинических лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 15189-2009, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, OHSAS 18001:2007.

№ направления:	3134718237	дата:	2017-01-22	Фамилия:	Третьяков
ЛПУ:	Доктор с Вами Володарского			Имя:	Алексей Алексеевич
Доктор:		Дата рождения:	1981-12-29		
Адрес пациента:		Пол:	мужской		

**Наименование исследования****Результат****Ед. изм.****Нормальные значения****ГОРМОНЫ**

Пролактин	<b>294.05</b>	мМЕ/л	72.66 - 407.40
Эстрадиол	<b>309.0</b>	пмоль/л	

**Референсные пределы**

Возраст	девочки	мальчики
0-12 месяцев	28,2-155,9	30,3-85,6
1-5 лет	31,7-97,8	15,5-84,1
6-10 лет	30,3-137,8	14,8-69,2
11-14 лет	26,9-354,6	28,8-113,4
15-20 лет	34-953,4	29,6-181,9
<b>Женщины</b>		
Фолликулярная фаза		77,07-921
фаза середины цикла		140-2382
лютеиновая фаза		77,07-1145
Женщины в постменопаузе (без ГЗТ)		<36,7 - 103
Женщины в постменопаузе (на ГЗТ)		<36,7-528,5
Мужчины	40,37-161,48	

Тестостерон общий	<b>34.07</b>	+	нг/мл	1.66 - 8.11
-------------------	--------------	---	-------	-------------

**Рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU) и (ISSAM) по диагностике гипогонадизма у мужчин:**

**более 12 нмоль/л (3,46 нг/мл) - нормальный уровень тестостерона;**

**8-12 нмоль/л (2,30 -3,46 нг/мл) - рекомендовано определение свободного тестостерона;**

**менее 8 нмоль/л(2,30 нг/мл) - сниженный уровень тестостерона**