



Услуги лицензированы. Качество клинических лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2011, ГОСТ Р ИСО 15189:2009, ГОСТ Р ИСО 14001:2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2006, OHSAS 18001:2007.

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
---------------------------	-----------	----------	---------------------

	девочки	мальчики	Референсные пределы
Возраст			
0-12 месяцев	28,2-155,9	30,3-85,6	
1-5 лет	31,7-97,8	15,5-84,1	
6-10 лет	30,3-137,8	14,8-69,2	
11-14 лет	26,9-354,6	28,8-113,4	
15-20 лет	34-953,4	29,6-181,9	
Женщины			
Фолликулярная фаза		77,07-921	
фаза середины цикла		140-2382	
лютеиновая фаза		77,07-1145	
Женщины в постменопаузе (без ГЗТ)		<36,7 - 103	
Женщины в постменопаузе (на ГЗТ)		<36,7-528,5	
Мужчины	40,37-161,48		

Рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU) и (ISSAM) по диагностике гипогонадизма у мужчин:
более 12 нмоль/л - нормальный уровень тестостерона;
8-12 нмоль/л - рекомендовано определение свободного тестостерона;
менее 8 нмоль/л - сниженный уровень тестостерона